

CON PREVENCION REDUCES LA INFECCION

Breve descripción del incidente


Paciente de 78 años con depresión mayor y neoplasia de vejiga. Se diagnóstica de tumor estenosante de 4,1 cm en colon transverso.

Ingresa para cirugía programada laparoscópica asistida por robot Da Vinci. En la intervención hallan una tumoración de colon transverso que extirpan mediante hemicolectomía derecha con linfadenectomía.

Según la guía de profilaxis antibiótica preoperatoria de cirugía colorrectal: neomicina 1 gr + metronidazol 1 gr vía oral en pauta de 2 o 3 tomas el día previo a la cirugía. En su historia clínica está registrado una sola dosis de neomicina como administrada.

5 cinco días después de la intervención el paciente presenta febrícula y vómitos por lo que se reinterviene mediante laparotomía urgente hallando una peritonitis secundaria sin dehiscencia de la sutura.

Análisis de causas



Aprendizaje

RECURSOS HUMANOS
Monitorizar el cumplimiento del protocolo de medidas de precaución de infección quirúrgica.

FORMACION
Cursos formativos:
Guía de profilaxis antibiótica en cirugía
Lavado de manos quirúrgico.

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE
Llegada del paciente en estado de salud óptimo.
Control de factores intrínsecos

FACTORES RELACIONADOS CON LA ADECUACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Auditar y reforzar los procesos de esterilización.

FACTORES RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Determinar si el personal está capacitado para las tareas y el uso de equipos.

HERRAMIENTAS
Desarrollar un formulario del protocolo quirúrgico con campos obligatorios.