

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TOXICIDAD UNGUEAL DERIVADA DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

Rodríguez Valiente, Mónica; De Finis Pallares, Miriam; Sánchez Gálvez, Javier; Ruiz Carreño, Paula; Palacio Gaviria, Patricia; Alonso Romero, Jose Luis

Objetivo general: Evaluar la calidad de vida relacionada con las lesiones ungueales en pacientes con cáncer de mama

Objetivos específicos: Analizar el estado de salud de las pacientes utilizando el *EuroQol-5D*
Explorar las percepciones de las pacientes sobre la atención recibida mediante la *Escala Picker Patient Experience PPE-30*


Resultados:

Fueron derivadas a la unidad 35 pacientes de las que 16 cumplieron criterios y participaron en el estudio



Metodología: Estudio descriptivo, transversal y unicéntrico realizado en la consulta de lesiones oncológicas

Población y muestra: Pacientes oncológicas con lesiones ungueales en tratamiento mayores de 18 años atendidas en la consulta durante un periodo de 6 meses



El promedio de la percepción general del estado de salud de los pacientes relacionados con la afectación ungueal fue de 6.25 siendo la máxima 9 y mínima de 5.

Tabla 1. Picker Patient Experience PPE-30

¿La enfermera le informó de forma adecuada sobre los cuidados de sus lesiones?	100% Si totalmente 0% a veces 0% No
¿Le explicaron de forma comprensible los efectos del tratamiento?	94% si totalmente 6% a veces 0% No
Si realizó alguna pregunta ¿obtuvo una respuesta clara?	100% si totalmente 0% a veces 0% No
¿Hubiese querido participar más en las decisiones tomadas sobre sus cuidados y tratamientos?	37.5% Si 62.5% No
¿Se sintió tratado con respeto mientras estuvo en la consulta?	100% si totalmente 0% a veces 0% No
¿Encontró a alguien, del personal del hospital, con quien hablar de sus preocupaciones?	100% si 0% a veces 0% No

Criterios de inclusión:

1. Diagnóstico de cáncer de mama
2. Tratamiento actual con quimioterapia o inmunoterapia
3. Consentimiento informado firmado

Criterios de exclusión:

1. Pacientes con condiciones cognitivas o físicas que limiten la participación
2. Rechazo a participar en el estudio

Instrumentos empleados:

- EuroQol-5D
- Escala Picker Patient Experience PPE-30

Discusión y Conclusiones

- Las lesiones derivadas del tratamiento oncológico disminuyen la calidad de vida de un gran porcentaje de estas pacientes.
- Aportar soluciones rápidas que disminuyan el tiempo de afectación de estos efectos es necesario según las pacientes.
- Las pacientes encuestadas valoran de forma positiva la creación de esta consulta y el trato recibido. Además, consideran necesaria la coordinación entre diferentes servicios y especialistas.
- Por todo ello, consideramos que la prevención de estas lesiones debería ser una línea futura en la que enfocarnos.