

ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON RADIOIODO 131 EN PACIENTES CON CÁNCER TIROIDEO INCIDENTAL EN EL HOSPITAL MORALES MESEGUER.

Lucas Zamorano, Isabel; Buitrago Ruiz, Manuel; Flores Pastor, Benito; Martínez Moreno, José Luis; Piñera Morcillo, Clara; Soria Aledo, Victoriano

INTRODUCCIÓN

Los incidentalomas tiroideos son neoplasias malignas que se descubren de manera inesperada en una investigación por otros motivos. Lo más frecuentes se descubren tras una cirugía por un proceso benigno. Esto cambia el tratamiento y el seguimiento.


El tratamiento con Radioiodo 131 es un tratamiento adyuvante tras la cirugía, con múltiples efectos adversos.

Las guías ATA 2015 fueron las primeras en marcar un uso más selectivo, solamente para pacientes con factores de riesgo.

El objetivo es analizar si la serie de incidentalomas intervenidos en nuestro centro ha recibido radioiodo 131 según los criterios de ATA 2015.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de tumores incidentales diagnosticados tras cirugía tiroidea por proceso benigno entre los años 2000-2015 en el Hospital Morales Meseguer.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES




163 Pacientes con incidentalomas tiroideos tras cirugía benigna



Tratamiento con Radioiodo 131: 122
No tratamiento con Radioiodo 131: 41

TRATAMIENTO CON RADIOIODO 131 INADECUADO EN 102 PACIENTES



No diferencia estadísticamente significativas entre dar tratamiento y las recurrencias. Existe un sobretratamiento en nuestro centro, pero con el paso de los años se está haciendo un uso más selectivo.